



ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫВЕРЕННЫЙ ПОДХОД К ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРИТА

RHEUMA LINE

OSTENIL®



- МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ
- МИНИМАЛЬНАЯ НА АПТЕЧНОМ РЫНКЕ СТОИМОСТЬ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ






Ostenil – Гиалуронат Na 20 мл / 2 мл

Курс : 3-5 инъекций



СУЩЕСТВЕННО УМЕНЬШАЕТ БОЛЬ, УЛУЧШАЕТ ФУНКЦИЮ СУСТАВА ¹⁻⁶



Коксартроз: анальгетический эффект Ostenil превосходит действие лидокаина через 1 месяц ⁴




Ostenil Mini – Гиалуронат Na 10 мл / 1 мл

Курс : 1-3 инъекций




ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРИТА МЕЛКИХ СУСТАВОВ ⁷⁻⁹

Фасеточный синдром: Ostenil Mini избавляет от боли на 6 месяцев после первой инъекции ⁸



Остеоартрит стопы: Одна внутрисуставная инъекция Ostenil Mini существенно снижает боль в сравнении с кортикостероидом ⁹



1. Fraiman S, Aparicio R. Rev Argent Gerontol Geriatr. 2002;22:15-20. Spanish.

2. Uebelhart D, Berz S. Osteoarthritis Cartilage. 2003;11(Suppl A):S80. Abstract No.: P223.

3. Mathies B, Berger J, Siegfried C, Gurny R. ICRS Abstract Book. 2004. Abstract No.: 397.

4. Tsvetkova ES, Denisov L, Schmidt EI, Ryabitseva O, Anikin S. Ann Rheum Dis. 2010;69(Suppl 3):281. Abstract No.: THU0411.

5. Funk L. Osteoarthritis Cartilage. 2004;12(Suppl B):S140. Abstract No.: P338.

6. Altman RD, Bedi A, Karlsson J, Sancheti P, Schemitsch E. Am J Sports Med. 2016;44(8):2158-65.

7. Fuchs S, Erbe T, Fischer HL, Tibesku CD. J Vasc Interv Radiol. 2005;16(11):1493-8.

8. Pons M, Alvarez F, Solana J, Viladot R, Varela L. Foot Ankle Int. 2007;28(1):38-42.

9. Fuchs S, Mönikes R, Wohlmeiner A, Heyse T. Osteoarthritis Cartilage. 2006;14(1):82-8.